



OBSERVATORIO DE SALUD  
EN ASTURIAS

# DOCUMENTO TÉCNICO DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN ASTURIAS

Anexo de Indicadores ampliados.

Mortalidad y Morbilidad

Asturias, 2012

## MORTALIDAD

Indicador	Tasa de mortalidad por cáncer*		
Descripción	Señala la mortalidad específica para cáncer de la población utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	415,2	253,2
	Mujeres:	248,1	116,6
	Total	328,3	174,7

\* Se incluyen los tumores malignos, in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido (códigos C00-D48 de la CIE-10)

Indicador	Tasa de mortalidad por cáncer de colon (colon\rectosigm\recto)*		
Descripción	Señala la mortalidad específica para cáncer de colon de la población utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	60,3	33,8
	Mujeres:	39,2	16,8
	Total	49,3	23,6

\* Se incluyen los tumores malignos de colon, unión rectosigmoidea y recto (códigos C18-C20 de la CIE-10)

Indicador	Tasa de mortalidad por cáncer de pulmón*		
Descripción	Señala la mortalidad específica para cáncer de pulmón de la población utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	106,4	67,5
	Mujeres:	19,1	12,5
	Total	61,0	36,5

\* Se incluyen los tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón (códigos C33-C34 de la CIE-10)

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por cáncer de mama*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica para cáncer de mama de la población utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
	Mujeres:	<b>36,0</b>	<b>18,1</b>
	Total	<b>18,8</b>	<b>10,1</b>

\* Se incluyen los tumores malignos de mama (código C50 de la CIE-10)

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por cáncer de cérvix*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica para cáncer de cervix de la población utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:		
	Mujeres:	<b>4,3</b>	<b>2,4</b>
	Total	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>

\* Se incluyen los tumores malignos del cuello del útero (código C53 de la CIE-10)

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por cáncer de próstata*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica para cáncer de próstata de la población utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	<b>40,9</b>	<b>21,6</b>
	Mujeres:		
	Total	<b>19,6</b>	<b>8,3</b>

\* Se incluyen los tumores malignos de la próstata (código C61 de la CIE-10)

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por cáncer en la infancia (0-14 años)*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica para cáncer en la infancia (entre 0 y 14 años), utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	<b>8,8</b>	<b>8,7</b>
	Mujeres:	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
	Total	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>

\* Se incluyen los tumores malignos, in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido (códigos C00-D48 de la CIE-10)

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por enf del sistema circulatorio*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica para enfermedades del sistema circulatorio de la población, utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes poblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	<b>359,6</b>	<b>200,2</b>
	Mujeres:	<b>428,4</b>	<b>121,9</b>
	Total	<b>395,4</b>	<b>158,2</b>

\* Códigos I00-I99 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por enf isquémica del corazón*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica para enfermedad isquémica cardiaca de la población, utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	<b>150,3</b>	<b>87,0</b>
	Mujeres:	<b>114,8</b>	<b>33,8</b>
	Total	<b>131,9</b>	<b>57,5</b>

\* Códigos I20-I25 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica para enfermedad cerebrovascular de la población utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	<b>74,3</b>	<b>39,5</b>
	Mujeres:	<b>112,0</b>	<b>32,6</b>
	Total	<b>93,9</b>	<b>36,1</b>

\* Códigos I60-I69 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa específica de mortalidad por IAM en 40-64 años (grupos quinquenales)</b>			
Descripción	Señala la mortalidad específica para Infarto Agudo de Miocardio de la población, utilizando un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo). Datos quinquenales para hombres y mujeres entre 40 y 64 años..			
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública			
Año usado	2009			
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>
Valor (tasa x 100.000)	40-44	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>
	45-49	<b>26,1</b>	<b>4,6</b>	<b>15,2</b>
	50-54	<b>89,1</b>	<b>4,7</b>	<b>45,7</b>
	55-59	<b>82,5</b>	<b>18,3</b>	<b>49,6</b>
	60-64	<b>121,4</b>	<b>19,2</b>	<b>67,7</b>

<b>Indicador</b>	<b>Tasa específica de mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares en 40-64 años (grupos quinquenales)</b>			
Descripción	Señala la mortalidad específica para Enfermedades Cerebrovasculares de la población, utilizando un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo). Datos quinquenales para hombres y mujeres entre 40 y 64 años.			
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública			
Año usado	2009			
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>
Valor (tasa x 100.000)	40-44	<b>12,1</b>	<b>4,8</b>	<b>8,4</b>
	45-49	<b>11,9</b>	<b>2,3</b>	<b>7,0</b>
	50-54	<b>17,3</b>	<b>16,4</b>	<b>16,9</b>
	55-59	<b>24,8</b>	<b>13,1</b>	<b>18,8</b>
	60-64	<b>48,5</b>	<b>13,7</b>	<b>30,2</b>

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por SIDA*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica para SIDA de la población utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		Bruta	Estandarizada
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	2,9	2,5
	Mujeres:	0,9	0,9
	Total	1,8	1,7

\* Códigos B20-B24 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por enfermedades mentales y del comportamiento*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica para enfermedades mentales y del comportamiento, utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		Bruta	Estandarizada
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	41,7	20,5
	Mujeres:	81,0	20,5
	Total	62,1	20,9

\* Códigos F00-F99 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por enfermedad del sistema respiratorio*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica por enfermedades del aparato respiratorio de la población, utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes poblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		Bruta	Estandarizada
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	151,5	76,8
	Mujeres:	87,9	24,7
	Total	118,4	44,8

\* Códigos J00-J99 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores (excepto asma)*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica para enf crónicas de vías resp inf (exc asma), de la población utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes poblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	<b>78,5</b>	<b>39,4</b>
	Mujeres:	<b>16,7</b>	<b>4,8</b>
	Total	<b>46,3</b>	<b>17,9</b>

\* Códigos J40-J44 y J47 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por enfermedades del sistema digestivo*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica por enfermedades del sistema digestivo, de la población utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes poblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	<b>66,4</b>	<b>40,6</b>
	Mujeres:	<b>53,3</b>	<b>17,5</b>
	Total	<b>59,6</b>	<b>28,1</b>

\* Códigos K00-K93 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por causas externas*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica para causas externas, de la población utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	<b>57,8</b>	<b>43,5</b>
	Mujeres:	<b>28,0</b>	<b>14,6</b>
	Total	<b>42,3</b>	<b>28,3</b>

\* Códigos V01-Y89 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por accidentes de tráfico*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica para accidentes de tráfico, de la población utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor	Hombres:	<b>10,0</b>	<b>8,2</b>
(tasa x 100.000)	Mujeres:	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>
	Total	<b>6,3</b>	<b>5,2</b>

\* Códigos V02-V04 con .1.9 V09.2.3, V12-V14 .3.4.5.9 V19.4.5.6.9, V20-V28 .3.4.5.9, V29.4.5.6.9, V30-V38.4.5.6.7.9, V39.4.5.6.9, V40-V48.4.5.6.7.9, V49.4.5.6.9, V50-V58.4.5.6.7.9, V59.4.5.6.9, V60-V68.4.5.6.7.9, V69.4.5.6.9, V70-V78.4.5.6.7.9, V79.4.5.6.9 y V80.3.4 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por suicidio*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica por suicidio, de la población utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor	Hombres:	<b>17,3</b>	<b>12,7</b>
(tasa x 100.000)	Mujeres:	<b>4,8</b>	<b>3,6</b>
	Total	<b>10,8</b>	<b>7,8</b>

\* Códigos X60-X84 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por homicidio*</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica por homicidio, de la población utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor	Hombres:	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>
(tasa x 100.000)	Mujeres:	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
	Total	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>

\* Códigos X85-Y09 y Y87.1 de la CIE-10



<b>Indicador</b>	<b>Tasa de mortalidad por envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso *</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica por mortalidad por envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso, de la población utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo)		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>
	Mujeres:	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
	Total	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>

\* Códigos X41, X42, X44 y X45 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa estandarizada de mortalidad por enfermedades crónicas en personas &lt; 65 años</b>			
Descripción	Señala la mortalidad específica por un grupo de enfermedades crónicas* en personas menores de 65 años, utilizando un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo) <i>*Enfermedades crónicas: neoplasias malignas, diabetes, enfermedad isquémica cardíaca, ACV, EPOC, enfermedad hepática crónica</i>			
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública			
Año usado	2009			
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>
Valor (tasa x 100.000)	Tasa estandarizada* de mortalidad por tumores en <65 años	<b>99,4</b>	<b>57,9</b>	<b>77,9</b>
	Tasa estandarizada* de mortalidad por diabetes en <65 años	<b>2,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>
	Tasa estandarizada* de mortalidad por enf. Isquémica del corazón en <65 años	<b>28,4</b>	<b>4,1</b>	<b>15,9</b>
	Tasa estandarizada* de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en <65 años	<b>7,8</b>	<b>3,9</b>	<b>5,8</b>
	Tasa estandarizada* de mortalidad por enfermedades Crónicas de vías resp. inferiores (excepto asma) en <65 años	<b>5,3</b>	<b>0,8</b>	<b>3,0</b>
	Tasa estandarizada* de mortalidad por cirrosis y otras enf.crónicas del hígado en <65 años	<b>16,0</b>	<b>2,8</b>	<b>9,2</b>

\* estandarizada por población europea

<b>Indicador</b>	<b>Tasa bruta de mortalidad por enfermedades crónicas en personas &lt; 65 años</b>			
Descripción	Señala la mortalidad específica real por un grupo de enfermedades crónicas* en personas menores de 65 años. <i>*Enfermedades crónicas: neoplasias malignas, diabetes, enfermedad isquémica cardíaca, ACV, EPOC, enfermedad hepática crónica</i>			
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública			
Año usado	2009			
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>
Valor (tasa x 100.000)	Tasa bruta de mortalidad por tumores en <65 años	126,3	77,6	102,0
	Tasa bruta de mortalidad por diabetes en <65 años	3,1	1,9	2,5
	Tasa bruta de mortalidad por enf. Isquémica del corazón en <65 años	36,5	5,4	21,0
	Tasa bruta de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en <65 años	10,1	5,2	7,7
	Tasa bruta de mortalidad por enfermedades Crónicas de vías resp. inferiores (excepto asma) en <65 años	7,1	1,2	4,1
	Tasa bruta de mortalidad por cirrosis y otras enf.crónicas del hígado en <65 años	20,5	3,8	12,1

<b>Indicador</b>	<b>Tasa conjunta de mortalidad por enfermedades crónicas en personas &lt; 65 años</b>		
Descripción	Señala la mortalidad específica y conjunta por un grupo de enfermedades crónicas* en personas menores de 65 años, utilizando además un método de estandarización para permitir la comparación entre diferentes subpoblaciones. El método utilizado es la estandarización por población europea (método directo) <i>*Enfermedades crónicas: neoplasias malignas, diabetes, enfermedad isquémica cardíaca, ACV, EPOC, enfermedad hepática crónica</i>		
Fuente	Registro de Mortalidad. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2009		
		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
Valor (tasa x 100.000)	Hombres:	203,6	159,3
	Mujeres:	95,1	70,8
	Total	149,4	113,6

## MORBILIDAD

### Cáncer

Indicador	Tasa de incidencia de Cáncer (todos los tipos exceptuando piel no melanoma)* *		
Descripción	Incidencia de cáncer (todos los tipos exceptuando piel no melanoma, localizaciones C00-D47). Tasa estandarizada por población europea		
Fuente	Registro de Cáncer. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2007		
Valores (por 100.000h)		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
	Hombres	<b>765,59</b>	<b>526,14</b>
	Mujeres	<b>463,21</b>	<b>285,94</b>
	<b>Total</b>		

\* Incluye tumores malignos de cualquier localización anatómica en personas residentes en Asturias excepto los de piel no melanoma e incluye también los tumores benignos y de comportamiento incierto del SNS y los tumores in situ y de comportamiento incierto de la vejiga urinaria (C00-D47 de la CIE-10).

Indicador	Tasa de incidencia de Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón*		
Descripción	Incidencia de cáncer Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón (localizaciones C33-34). Tasa estandarizada por población europea		
Fuente	Registro de Cáncer. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2007		
Valores (por 100.000h)		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
	Hombres	<b>127,50</b>	<b>88,66</b>
	Mujeres	<b>20,37</b>	<b>13,51</b>
	<b>Total</b>		

\* Códigos C33-C34 de la CIE-10

Indicador	Tasa de incidencia de Cáncer mama*		
Descripción	Incidencia de cáncer de mama (localizaciones C50). Tasa estandarizada por población europea		
Fuente	Registro de Cáncer. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2007		
Valores (por 100.000h)		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
	Hombres	<b>3,11</b>	<b>2,22</b>
	Mujeres	<b>129,39</b>	<b>87,32</b>
	<b>Total</b>		

\* Código C50 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de incidencia de Cáncer colorrectal (también incluye ano)*</b>		
Descripción	Incidencia de cáncer colorrectal (también incluye ano, localizaciones C18-21). Tasa estandarizada por población europea		
Fuente	Registro de Cáncer. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2007		
Valores (por 100.000h)		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
	<b>Hombres</b>	<b>116,63</b>	<b>75,45</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>69,11</b>	<b>36,64</b>
	<b>Total</b>		

\* Códigos C18-C21 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de incidencia de Cáncer de próstata*</b>		
Descripción	Incidencia de cáncer de próstata (localización C-61). Tasa estandarizada por población europea.		
Fuente	Registro de Cáncer. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2007		
Valores (por 100.000h)		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
	<b>Hombres</b>	<b>160,49</b>	<b>109,04</b>
	<b>Mujeres</b>		
	<b>Total</b>		

\* Código C61 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de incidencia de Cáncer de cérvix*</b>		
Descripción	Incidencia de cáncer de cérvix (localización C-53). Tasa estandarizada por población europea		
Fuente	Registro de Cáncer. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2007		
Valores (por 100.000h)		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
	<b>Hombres</b>		
	<b>Mujeres</b>	<b>10,54</b>	<b>8,33</b>
	<b>Total</b>		

\* Código C53 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de incidencia de Cáncer de cuerpo uterino*</b>		
Descripción	Incidencia de cáncer de cuerpo uterino (localización C54-C55). Tasa estandarizada por población europea		
Fuente	Registro de Cáncer. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública		
Año usado	2007		
Valores (por 100.000h)		<b>Bruta</b>	<b>Estandarizada</b>
	<b>Hombres</b>		
	<b>Mujeres</b>	<b>32,88</b>	<b>20,85</b>
	<b>Total</b>		

\* Códigos C54-C55 de la CIE-10

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de incidencia de Cáncer infantil (0-14 años)*</b>	
Descripción	Incidencia de cáncer en niños (localizaciones C00-D47) en población infantil entre los 0 y los 14 años). Tasa estandarizada por población europea	
Fuente	Registro de Cáncer. Sección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública	
Año usado	2007	
		<b>Tasa específica 0-14</b>
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	<b>23,59</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>17,30</b>
	<b>Total</b>	<b>20,54</b>

\* Códigos C00-D47 de la CIE-10

### Enfermedades infecciosas

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de casos de varicela</b>	
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de varicela a partir del sistema de enfermedades de declaración obligatoria	
Fuente	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	
	<b>Mujeres</b>	
	<b>Total</b>	<b>434,32</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de casos de sarampión</b>	
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de sarampión a partir del sistema de enfermedades de declaración obligatoria	
Fuente	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	
	<b>Mujeres</b>	
	<b>Total</b>	<b>2,14</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de casos de rubeola</b>	
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de rubeola a partir del sistema de enfermedades de declaración obligatoria	
Fuente	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	
	<b>Mujeres</b>	
	<b>Total</b>	<b>0,0</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de casos de parotiditis</b>
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de parotiditis a partir del sistema de enfermedades de declaración obligatoria
Fuente	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias
Año usado	2011
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>
	<b>Mujeres</b>
	<b>Total</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de casos de difteria</b>
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de difteria a partir del sistema de enfermedades de declaración obligatoria
Fuente	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias
Año usado	2011
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>
	<b>Mujeres</b>
	<b>Total</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de casos de tétanos</b>
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de tétanos a partir del sistema de enfermedades de declaración obligatoria
Fuente	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias
Año usado	2011
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>
	<b>Mujeres</b>
	<b>Total</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de casos de tosferina</b>
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de tosferina a partir del sistema de enfermedades de declaración obligatoria
Fuente	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias
Año usado	2011
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>
	<b>Mujeres</b>
	<b>Total</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de casos de parálisis flácida aguda en menores de 15 años de edad</b>
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de parálisis flácida aguda en menores de 15 años de edad a partir del sistema de enfermedades de declaración obligatoria (EDO)
Fuente	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias
Año usado	2011
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>
	<b>Mujeres</b>
	<b>Total</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de casos de enfermedad meningocócica</b>	
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de Enfermedad meningocócica a partir del sistema de EDO	
Fuente	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	
	<b>Mujeres</b>	
	<b>Total</b>	<b>1,58</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de casos de hepatitis vírica A</b>	
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de Hepatitis vírica A a partir del sistema de EDO	
Fuente	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	
	<b>Mujeres</b>	
	<b>Total</b>	<b>1,49</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de casos de hepatitis vírica B</b>	
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de Hepatitis vírica B a partir del sistema de EDO	
Fuente	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	
	<b>Mujeres</b>	
	<b>Total</b>	<b>0,74</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de casos de Otras hepatitis víricas</b>	
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de Otras Hepatitis víricas a partir del sistema de EDO	
Fuente	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Asturias	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	
	<b>Mujeres</b>	
	<b>Total</b>	<b>1,76</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de infecciones por Salmonella</b>	
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de infecciones por Salmonella a partir del sistema de información microbiológico	
Fuente	Sistema de Información Microbiológica	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	<b>22,53</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>17,41</b>
	<b>Total</b>	<b>20,34</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de casos de legionelosis</b>	
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de legionelosis a partir del sistema de EDO	
Fuente	Sistema de Información Microbiológico	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	<b>3,47</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>0,53</b>
	<b>Total</b>	<b>1,94</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de neumococo invasivo</b>	
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de Neumococo invasivo a partir del sistema de información microbiológico	
Fuente	Sistema de Información Microbiológico	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	<b>12,92</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>7,99</b>
	<b>Total</b>	<b>10,36</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de Yersinia</b>	
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de Yersinia a partir del sistema de información microbiológico	
Fuente	Sistema de Información Microbiológico	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	<b>2,70</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>3,02</b>
	<b>Total</b>	<b>2,87</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de Gonococia</b>	
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de Gonococia a partir del sistema de información microbiológico	
Fuente	Sistema de Información Microbiológico	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	<b>8,10</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>1,24</b>
	<b>Total</b>	<b>4,53</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de Sífilis</b>	
Descripción	Tasas por cien mil habitantes de la incidencia de casos de Sífilis a partir del sistema de información microbiológico	
Fuente	Sistema de Información Microbiológico	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	<b>21,98</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>6,93</b>
	<b>Total</b>	<b>14,15</b>



## Salud Mental

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de psicosis esquizofrénica</b>	
Descripción	Tasa de incidencia: nº de casos diagnosticados de psicosis esquizofrénica en población > 14 años (x 100.000) (CIE 10: F20-F20.9)	
Fuente	Servicios de Salud Mental	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	<b>71,12</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>23,87</b>
	<b>Total</b>	<b>46,34</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de psicosis maniaco-depresiva</b>	
Descripción	Tasa de incidencia: nº de casos diagnosticados de psicosis maniaco-depresiva en población > 14 años (x 100.000)(CIE 10: F31-F31.9)	
Fuente	Servicios de Salud Mental	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	<b>15,88</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>27,22</b>
	<b>Total</b>	<b>21,83</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de trastornos de hiperactividad en la infancia</b>	
Descripción	Tasa de incidencia: nº de casos de trastornos de hiperactividad en población < 15 años (x 100.000) (CIE 10: F90-F90.9)	
Fuente	Servicios de Salud Mental	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	<b>200,70</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>55,37</b>
	<b>Total</b>	<b>129,81</b>

<b>Indicador</b>	<b>Incidencia de trastornos del comportamiento en la infancia</b>	
Descripción	Tasa de incidencia: nº de casos diagnosticados de trastornos del comportamiento en población < 15 años (x 100.000) (CIE 10: F93, F94, F95 y F98)	
Fuente	Servicios de Salud Mental	
Año usado	2011	
Valores (por 100.000h)	<b>Hombres</b>	<b>484,74</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>369,72</b>
	<b>Total</b>	<b>428,63</b>

## Enfermedades renales

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de incidencia de insuficiencia renal crónica en tratamiento sustitutivo</b>	
Descripción	Nº de personas residentes en Asturias con insuficiencia renal crónica que han iniciado por primera vez un tratamiento sustitutivo durante el año/población general x 1.000.000	
Fuente	Registro de Enfermos Renales Crónicos	
Año usado	2010	
Valores (por millón de habitantes)	<b>Hombres</b>	<b>180,63</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>76,25</b>
	<b>Total</b>	<b>126,35</b>

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de prevalencia de insuficiencia renal crónica en tratamiento sustitutivo</b>	
Descripción	Nº de personas residentes en Asturias con insuficiencia renal crónica que a 31-diciembre del año correspondiente están recibiendo un tratamiento sustitutivo/población general x 1.000.000	
Fuente	Registro de Enfermos Renales Crónicos	
Año usado	2010	
Valores (por millón de habitantes)	<b>Hombres</b>	<b>1300,92</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>709,30</b>
	<b>Total</b>	<b>993,23</b>

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de incidencia de trasplante renal</b>	
Descripción	Nº de trasplantes renales realizados en personas residentes en Asturias durante el año/población general x 1.000.000	
Fuente	Registro de Enfermos Renales Crónicos	
Año usado	2010	
Valores (por millón de habitantes)	<b>Hombres</b>	<b>55,73</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>24,83</b>
	<b>Total</b>	<b>39,66</b>

<b>Indicador</b>	<b>Tasa de prevalencia de trasplante renal</b>	
Descripción	Nº de personas residentes en Asturias que a 31-diciembre del año correspondiente tienen un injerto renal funcional/población general x 1.000.000	
Fuente	Registro de Enfermos Renales Crónicos	
Año usado	2010	
Valores (por millón de habitantes)	<b>Hombres</b>	<b>759,03</b>
	<b>Mujeres</b>	<b>377,70</b>
	<b>Total</b>	<b>560,71</b>

## Defectos congénitos

<b>Indicador</b>	<b>Prevalencia total de Defectos Congénitos</b>
Descripción	nº de niños y/o fetos, que presentan uno o más defectos congénitos, por 10.000 nacimientos
Fuente	Datos procedentes del RDCA, publicados por <u>EUROCAT</u>
Año usado	Periodo 2000-2004
Valores (por 10.000 nacimientos)	<b>299,12</b>

<b>Indicador</b>	<b>Prevalencia de Defectos Congénitos al Nacimiento</b>
Descripción	Nº de nacidos vivos con uno o más defectos congénitos, por 10.000 nacimientos
Fuente	Datos procedentes del RDCA, publicados por <u>EUROCAT</u>
Año usado	Periodo 2000-2004
Valores (por 10.000 nacimientos)	<b>237,69</b>

<b>Indicador</b>	<b>Prevalencia total de anomalías cromosómicas</b>
Descripción	Número de niños y/o fetos, que presentan una o más anomalías cromosómicas, por 10.000 nacimientos
Fuente	Datos procedentes del RDCA, publicados por <u>EUROCAT</u>
Año usado	Periodo 2000-2004
Valores (por 10.000 nacimientos)	<b>42,20</b>

<b>Indicador</b>	<b>Prevalencia de anomalías cromosómicas al nacimiento</b>
Descripción	Nº de nacidos vivos con una o más anomalías cromosómicas al nacimiento, por 10.000 nacimientos
Fuente	Datos procedentes del RDCA, publicados por <u>EUROCAT</u>
Año usado	Periodo 2000-2004
Valores (por 10.000 nacimientos)	<b>14,64</b>